Universidade de São Paulo Instituto de Física

FEP113 - FÍSICA EXPERIMENTAL 1

AULA SÍNTESE 2010

Dimensões Euclidianas

Prof. José Fernando Diniz Chubaci
Prof. Alexandre de Lima Correa

Agradecimentos especiais ao Prof. Paulo Pascholati, Prof. Tiago Fiorini e à Profa. Márcia de Almeida Rizzutto por permitirem acesso às suas notas de aulas.

Os Elementos Euclides

"um ponto é o que não tem parte"

**"uma recta é um comprimento
sem largura"**

**"uma superfície é o que tem
apenas comprimento e largura".**

Mittelalterliches Portrait Euklids

“PERGUNTA À NATUREZA”:

QUAL É A DENSIDADE DE UM CORPO?

Quais as hipóteses que se deve fazer para encontrar a resposta?

Se o corpo é homogêneo temos a densidade dele, caso contrário temos a sua densidade média.

Hipóteses

■ **Densidade:**

- Os objetos de cada grupo, esferas, bastões e discos, são compostos homogeneamente pelo mesmo material.

■ **Densidade Linear:**

- Os bastões possuem o mesmo diâmetro.

■ **Densidade Superficial:**

- Os discos possuem a mesma altura.
-

Objetivos

□ **Determinar as densidades de diferentes objetos.**

□ **Medir densidades?**

Bastão - linear;
Disco - superficial;
Esfera - volumétrica.

□ **Instrumentos?**

Régua;
Paquímetro;
Balanças.

Procedimento: Relacionar a massa do corpo com seu comprimento característico.

Esferas: diâmetro

Discos : diâmetro

Bastonetes: comprimento

Dimensões Euclidianas

- para materiais sólidos homogêneos:
 - A massa m possui uma relação linear com o volume:

$$m = d_3 v$$

onde d_3 é a densidade volumétrica.

$$v = f(L_1, L_2, L_3)$$

$$m = K_3 L_1 L_2 L_3$$

Esferas

$$M \cong kD_1 D_2 D_3$$

$$M \cong kD^3$$

Onde k é proporcional à densidade volumétrica da esfera

Esferas

Esferas

Esferas Modelo: $Y = aX + b$

Esferas Modelo: $Y = aX + b$

Esferas

$$\square M = d_3 V$$

$$V = \frac{4}{3} \pi \left(\frac{D}{2} \right)^3$$

$$M = d_3 \frac{4}{3} \pi \left(\frac{D}{2} \right)^3$$

Onde d_3 é a densidade volumétrica da esfera

Esferas

$$M = d_3 \frac{4}{3} \pi \left(\frac{D}{2} \right)^3 \quad M = \left(d_3 \frac{\pi}{6} \right) D^3$$

É o coeficiente angular da reta ajustada

$$a_v = d_3 \frac{\pi}{6} \quad \longrightarrow \quad d_3 = a_v \frac{6}{\pi}$$

Incerteza de d_3 é a mesma de a_v

Densidade volumétrica

Discos

$$M \cong kD_1 D_2$$

$$M \cong kD^2$$

Onde k é proporcional a densidade superficial do disco

Discos

Discos Modelo: $Y = aX + b$

Discos

$$\square M = d_2 A$$

$$A = \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2$$

$$M = d_2 \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2$$

Onde d_2 é a densidade superficial do disco

Discos

$$M = d_2 \pi \left(\frac{D}{2} \right)^2$$

$$M = d_2 \frac{\pi}{4} D^2$$

É o coeficiente angular da reta ajustada

$$a_s = d_2 \frac{\pi}{4}$$

$$d_2 = a_s \frac{4}{\pi}$$

Bastões

$$M \cong kD$$

□ $M = d_1 H$

Onde d_1 é a densidade linear do bastonete

Bastões

Bastões Modelo: $Y = aX + b$

Bastões

$$\square M = d_1 H$$

É o coeficiente angular da reta ajustada

$$a_1 = d_1$$

Densidades Volumétricas ρ

Bastões

A densidade volumétrica depende da área da secção reta do bastonete (D^2)

$$\blacksquare M = d_1 L$$

$$\rho = \frac{d_1}{A} = \frac{4d_1}{\pi D^2}$$

$$\rho = \frac{g}{cm} \frac{1}{cm^2}$$

$$d_1 \pm s d_1 \quad D \pm s D \quad s\rho = \sqrt{|s(\rho)_{d_1}|^2 + |s(\rho)_D|^2}$$

Densidades Volumétricas ρ

Discos

A densidade volumétrica depende da espessura do disco (e)

$$\blacksquare M = d_2 A$$

$$\rho = \frac{d_2}{e}$$

$$\rho = \frac{g}{cm^2} \frac{1}{cm}$$

$$d_2 \pm s d_2$$

$$e \pm s e$$

$$s\rho = \sqrt{|s(\rho)_{d_2}|^2 + |s(\rho)_e|^2}$$

Propagação de incerteza

$$s_{\rho} = \sqrt{\left|s(\rho)_{d_r}\right|^2 + \left|s(\rho)_e\right|^2}$$

$$s_w = \sqrt{\left(\frac{\partial w}{\partial x} s_x\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial y} s_y\right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z} s_z\right)^2 + \dots}$$

Densidades Volumétricas de alguns materiais

- Aço $\rho = 7.7$ a 7.9 g/cm^3
 - Cobre $\rho = 8.93 \text{ g/cm}^3$
 - Zinco $\rho = 7.15 \text{ g/cm}^3$
 - Ferro $\rho = 7.80 \text{ g/cm}^3$
 - Bronze $\rho = 8.7$ a 8.9 g/cm^3
 - Latão $\rho = 8.4$ a 8.7 g/cm^3
 - Plástico $\rho = 1.07 \text{ g/cm}^3$
-

Exemplo de cálculo de densidade:

BASTÕES

$$M = K_1 L$$

Onde K_1 é a densidade linear do bastonete

Traçamos as retas média, máxima e mínima para encontrar os coeficientes da reta (a e b) e suas respectivas incertezas (s_a e s_b).

$$y = ax + b \quad \text{onde} \quad a = 0,036(20) \text{ (g/mm)} \quad \leftarrow \text{Valor de } K_1!$$

$$b = 0,03(10) \text{ g} \quad \leftarrow \text{Compatível com zero!}$$

A densidade volumétrica depende da área da secção reta do bastonete (πD^2)

$$\longrightarrow D = 2,33(5) \text{ mm}$$

$$d = \frac{K_1}{A} = \frac{4K_1}{\pi D^2} \quad d = 8,4(47) \text{ g/cm}^3$$

Exemplo de cálculo de densidade:

BASTÕES

$$d = 8,4(47) \text{ g/cm}^3$$

Valor tabelado para a densidade do Latão:

Latão $\rho = 8.4 \text{ a } 8.7 \text{ g/cm}^3$

O valor encontrado é compatível com o tabelado!

Resultados da experiência Dimensões Euclidianas

Resultados da experiência Dimensões Euclidianas - Discos

Resultados da experiência Dimensões Euclidianas - Bastão

Resultados da experiência Dimensões Euclidianas - Esferas

Resultados da experiência Dimensões Euclidianas

Conclusões:

- Estudamos a relação entre massa e dimensão de diferentes corpos;
 - Determinamos para os corpos:
 - Densidades lineares;
 - Superficiais;
 - Volumétricas.
 - Encontramos os valores das densidades volumétricas para todos os corpos
 - Diferenciamos os bastões feitos de latão das esferas feitas de aço (ferro).
-