TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOPEDIATRIA

Profa. Mariana Minatel Braga

Tutora Camila Guglielmi

Relembrando...
Indicação de analgésicos
e antinflamatórios



Analgésicos

Quando utilizar?

Intervenções com pequeno grau de traumatismo

- Exodontias simples
- Ulectomia/Ulotomia
- Gengivectomia

Analgésicos

- **Paracetamol** solução gotas 200mg/ml (Escolha)

  1 gota/kg (6/6 horas)

Por 3 dias

- **Dipirona** solução oral 500mg/ml

  ½ gota/KG (6/6 horas)

Por 3 dias

Exemplo

Uso Interno

Paracetamol gotas _____1 frasco
Administrar 15 gotas, por via oral, se apresentar dor, no máximo a cada 6 horas, por 3 dias

Analgésicos

Contra-indicados

- AAS

síndrome de Reyes, lesões hepáticas e cerebrais

Após procedimentos cirúrgicos

(inibição da coagulação)

Antiinflamatórios

Quando utilizar?

- Prevenção do edema pós-operatório
- Controle dos sinais da inflamação
- Exodontia de dentes inclusos ou anquilosados, frenectomias linguais

Antiinflamatórios

Esteroidal: **Betametasona** 0,05 mg/ml (Celestone®)

0,005/kg de peso corporal (1 h antes – dose única pré-operatória)

Não esteroidal: **Nimesulida** solução oral 50 mg/ml

1 gota/kg (6/6 horas)

Ibuprofeno suspensão 100 mg/5ml

5 a 10 mg/Kg, (6 /6 horas)

Exemplo

Uso Interno

Nimesulid gotas _____1 frasco

Administrar 15 gotas, por via oral, a cada 12 horas, por 4 dias

Antiinflamatórios

Contra-indicados

<u>Toxicidade</u>

- Indometacina (Indocid®)
- Ác. Mefenâmico (Ponstan®)
- Fenilbutazona (Butazolidina®)
- Oxifenilbutazona (Tandrex)

<u>Falta de eficácia/segurança</u>

- Diclofenacos (Cataflan®, Voltaren®)
- Piroxican (Feldene®)
- Enzimáticos (Parenzyme®)
- Associação de drogas, por ex. Lisador®

Antibióticos

Quando utilizar?

Manifestações sistêmicas de processos infecciosos: febre, taquicardia, falta de apetite, mal-estar

- abscessos agudos
- Traumatismos com possibilidade de contaminação
- Profilaticamente, em caso de imunodeficiência ou diabetes, por exemplo

Não deve ser utilizado em caso de

- Fístula
- Dor associada a pulpite
- Cirurgias simples

Antibióticos

Infecções leves a moderadas:

1. **Amoxicilina** (escolha)
2. **Cefalexina**
3. Estearato de **Eritromicina** ou **Clindamicina** (opção, alergia à penicilina)

Infecções graves

1. **Clavulanato de Potássio+Amoxicilina**
2. Metronidazol+amoxicilina

Antibióticos

Contra-indicados:



- Tetraciclinas – fixação tecidos minerais
- Cloranfenicol – reações medula óssea
- Aminoglicosídeos – toxicidade auditiva e renal

Amoxicilina (250 mg/5ml)

- 50 mg/kg/dia de 8/8 horas

Exemplo

Uso interno

Amoxicilina 250 mg/5ml_____1 frasco
Administrar X ml por via oral, a cada 8 horas durante 7 dias.

Cefalexina (250 mg/5ml)

- 50 mg/kg/dia de 6/6 horas

Exemplo

Uso interno

Cefalexina 250 mg/5ml_____1 frasco
Administrar X ml por via oral, a cada 6 horas durante 7 dias.

Eritromicina 250mg/5ml

- 50 mg/kg/dia de 6/6 horas

Exemplo

Uso interno

Eritromicina 250 mg/5ml_____1 frasco
Administrar X ml por via oral, a cada 6 horas
durante 7 dias.

Amoxicilina + Clavulanato de potássio e Metronidazol

Amoxicilina + Clavulanato de potássio

1 comprimido (500mg) a cada 12 horas

Metronidazol

20 mg/kg/dia de 6/6 horas

Profilaxia Antibiótica

INDICAÇÕES:

- Defesa imunológica alterada
- Locais altamente infectados
- Bacteremia resultaria em graves conseqüências

Amoxicilina – 50 mg/kg
Eritromicina – 20 mg/kg
Azitromicina – 1 mg/kg

} 1 hora antes do procedimento

POSOLOGIA PEDIÁTRICA

1 a 10 Anos

Peso (Kg) = (idade X 2) + 9