




# **TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA EM ODONTOPEDIATRIA**

Profa. Mariana Minatel Braga

Tutora: Camila Guglielmi

Relembrando...  
Indicação de analgésicos  
e antiinflamatórios

Antiinflamatórios  
Não esteroidais



# Analgésicos

Quando utilizar?

Intervenções com pequeno grau de traumatismo

- Exodontias simples
- Ulectomia/Ulotomia
- Gengivectomia



# Analgésicos

- **Paracetamol** solução gotas 200mg/ml (Escolha)

1 gota/kg (6/6 horas)

Por 3 dias

- **Dipirona** solução oral 500mg/ml

½ gota/KG (6/6 horas)

Por 3 dias

## Uso Interno

### Exemplo

Paracetamol gotas \_\_\_\_\_ 1 frasco  
Administrar 15 gotas, por via oral, se  
apresentar dor, no máximo a cada 6 horas, por 3 dias

# Analgésicos

Contra-indicados



- AAS

síndrome de Reyes, lesões hepáticas e cerebrais

Após procedimentos cirúrgicos

(inibição da coagulação)



# Antiinflamatórios

Quando utilizar?

- Prevenção do edema pós-operatório
- Controle dos sinais da inflamação
- Exodontia de dentes inclusos ou anquilosados, frenectomias linguais

# Antiinflamatórios

**Esteroidal: Betametasona 0,05 mg/ml (Celestone®)**

0,005/kg de peso corporal (1 h antes – dose única pré-operatória)

**Não esteroideal: Nimesulida** solução oral 50 mg/ml

1 gota/kg (6/6 horas)

**Ibuprofeno** suspensão 100 mg/5ml

5 a 10 mg/Kg, (6 /6 horas)

## Uso Interno

**Exemplo**

Nimesulid gotas \_\_\_\_\_ 1 frasco

Administrar 15 gotas, por via oral, a cada 12 horas, por 4 dias

# Antiinflamatórios

## Contra-indicados



### Toxicidade

- Indometacina (Indocid<sup>®</sup>)
- Ác. Mefenâmico (Ponstan<sup>®</sup>)
- Fenilbutazona (Butazolidina<sup>®</sup>)
- Oxifenilbutazona (Tandrex)

### Falta de eficácia/segurança

- Diclofenacos (Cataflan<sup>®</sup>, Voltaren<sup>®</sup>)
- Piroxican (Feldene<sup>®</sup>)
- Enzimáticos (Parenzyme<sup>®</sup>)
- Associação de drogas, por ex. Lisador<sup>®</sup>

# Antibióticos

## Quando utilizar?

Manifestações sistêmicas de processos infecciosos: febre, taquicardia, falta de apetite, mal-estar

- abscessos agudos
- Traumatismos com possibilidade de contaminação
- Profilaticamente, em caso de imunodeficiência ou diabetes, por exemplo

Não deve ser utilizado em caso de

- Fístula
- Dor associada a pulpite
- Cirurgias simples

# Antibióticos

Infecções leves a moderadas:

1. **Amoxicilina** (escolha)
2. **Cefalexina**
3. Estearato de **Eritromicina** ou **Clindamicina**  
(opção, alergia à penicilina )


Infecções graves

1. **Clavulanato de Potássio+Amoxicilina**
2. **Metronidazol+amoxicilina**

# Antibióticos

## Contra-indicados:

- Tetraciclina – fixação tecidos minerais
- Cloranfenicol – reações medula óssea
- Aminoglicosídeos – toxicidade auditiva e renal



# Amoxicilina (250 mg/5ml)

- 50 mg/kg/dia de 8/8 horas



Exemplo

## Uso interno

Amoxicilina 250 mg/5ml \_\_\_\_\_ 1 frasco  
Administrar X ml por via oral, a cada 8 horas  
durante 7 dias.

# Cefalexina (250 mg/5ml)

- 50 mg/kg/dia de 6/6 horas

Exemplo

Uso interno

Cefalexina 250 mg/5ml \_\_\_\_\_ 1 frasco  
Administrar X ml por via oral, a cada 6 horas  
durante 7 dias.

# Eritromicina 250mg/5ml

- 50 mg/kg/dia de 6/6 horas

Exemplo

Uso interno

Eritromicina 250 mg/5ml \_\_\_\_\_ 1 frasco  
Administrar X ml por via oral, a cada 6 horas  
durante 7 dias.

# Amoxicilina + Clavulanato de potássio e Metronidazol

Amoxicilina + Clavulanato de potássio

1 comprimido (500mg) a cada 12 horas

Metronidazol

20 mg/kg/dia de 6/6 horas



# Profilaxia Antibiótica

## INDICAÇÕES:

- Defesa imunológica alterada
- Locais altamente infectados
- Bacteremia resultaria em graves conseqüências

Amoxicilina – 50 mg/kg

Eritromicina – 20 mg/kg

Azitromicina – 1 mg/kg

} 1 hora antes do procedimento

# POSOLOGIA PEDIÁTRICA

**1 a 10 Anos**



$$\text{Peso (Kg)} = (\text{idade} \times 2) + 9$$